


Тваринний світ

Видовий та кількісний склад кажанів виявлених у печері Мушкарів яма за результатами обліку 09.01.2021 року.

Всього у печері виявлено 15 поодиноких особин Підковоніса малого (*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800))



Місця в печері де зустрічались кажани

Облік проводили:

О. Вікирчак, П. Площанський, І. Стефанишин, П. Кузьмин, П. Купріч, О. Малясова

Підковоніс малий. *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)



Особливості біології та наукове значення:

Найчастіше вид реєструють у стані гібернації, і більшість знахідок відноситься до підземних порожнин (печери, гроти, каменоломні, тунелі) або скельних відслонень. Осілий, здійснює лише локальні сезонні міграції (до 100 км). Виводкові колонії влаштовує теплих сховищах: гротах, горищах, під мостами. Політ швидкий і маневровий. Полює на галявинах, узліссях, садах, переважно на двокрилих і дрібних лускокрилих. Статевозрілим стає на 2-й рік життя, плодить раз на рік по 1 малечі. Живе до 17 років.

Морфологічні ознаки:

Має типові для роду *Rhinolophus* ознаки: гостроверхівкові вуха, розвинений комплекс носових утворів (підкова, сідло, ланцет), у спокої обгорнені крилами, хутро кремового відтінку. Розміри малі, довжина передпліччя 35-41 мм. Носовий листок з тупим і коротким (прямокутним) верхнім виступом сідла. Сідло рівномірно і виразно звужується до верху.

Вид занесено до [Червоної книги України](#)